


Hygiène du lieu de traite

ET DU TRAYEUR

Objectifs

- Travailler dans les meilleures conditions d'hygiène possibles,
- éviter de contaminer les mamelles par des germes qui peuvent pénétrer lorsque les sphincters sont ouverts,
- éviter de contaminer le lait en spores butyriques.



Techniques

Avant la traite

- Mouiller les quais avant l'entrée des animaux pour faciliter le nettoyage en fin de traite.
- Se laver les mains et les avant-bras avec soin, recouvrir les plaies des mains ou des bras avec un pansement étanche (présence de staphylocoques).
- Porter des vêtements de traite lavables et propres.
- Eventuellement, porter des gants propres jetables à changer à chaque traite.

Pendant la traite

- S'il y a des bouses, les évacuer immédiatement en évitant les projections intempestives, et laver quand le lot de vaches est sorti.
- Se laver les mains et les avant-bras si nécessaire.

Après chaque traite

- Racler et laver la salle de traite et les couloirs de retour,
- racler et laver l'aire d'attente afin de moins salir les quais,
- nettoyer en particulier l'extérieur des faisceaux trayeurs, les tuyaux longs à lait, la vaisselle de traite (gobelet de trempage, CMT, couvercle, bidon, etc.), ainsi que les plateaux de lavage.



Sans oublier

- D'éviter au maximum les poussières :

En cas de présence d'alimentateurs en salle de traite, veiller à ce que ce matériel soit opérationnel afin de minimiser les risques de propagation des poussières et faciliter le nettoyage.

- de lutter contre les mouches sur les animaux et dans les locaux,
- de décaper et désinfecter la salle de traite 2 ou 3 fois par an.

1 Décontamination des manchons en cours de traite

Suite au passage d'une vache à cellules ou mammites, les manchons restent contaminants pour les vaches suivantes.

Pour prévenir les contaminations par le faisceau-trayeur, plusieurs alternatives existent :

- utiliser un faisceau spécifique pour les vaches à problème,
- établir un ordre de traite avec lots (passer les vaches infectées en dernier),
- réaliser un rétro-lavage (flux d'eau depuis la griffe vers les manchons),
- désinfecter les griffes grâce à une solution à base par exemple d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène.

Plonger complètement la griffe dans un seau de solution diluée de désinfectant. Eviter la pulvérisation qui ne permet généralement pas une bonne application sur l'ensemble de la surface.

Laisser tremper pendant au moins 1 minute. Ne pas aspirer la solution et égoutter. Le rinçage à l'eau est à effectuer ou non selon les spécialités. Il n'est pas préjudiciable si l'eau est de bonne qualité bactériologique. L'utilisation d'eau de javel est à proscrire car très volatile, peu efficace en présence de matières organiques et irritante pour les trayons.



Le matériel en contact avec le lait doit être nettoyé avec une eau répondant au minimum au cahier des charges de la Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage.