

La traite

UN TEMPS D'OBSERVATION A VALORISER

Les enjeux généraux

La traite est un moment privilégié pour :

- relever un maximum d'indicateurs,
- détecter d'éventuels problèmes liés à la machine à traire ou liés à la vache elle-même.

Une traite traumatisante peut détériorer l'intégrité du trayon.



Détecter les anomalies liées à la machine à traire

Des anomalies lors de la traite peuvent vous donner l'alerte : glissement de manchon, chute de faisceaux, sifflements d'air, trayons humides en fin de traite, comportement inhabituel du troupeau (réticence à la traite, ordre de traite, bouses, circulation), etc.

Etat des trayons	% maximal toléré avant intervention
Congestion avec changement de couleur (rouge ou violet)*	20
Anneaux de compression	20
Micro-hémorragies (Pétéchies)	10
Extrémités dures	20
Hyper-kératose importante (stade rugueux)	20
Canaux ouverts en permanence	10
Trayons aplatis	10
Lésions de la peau	5

* Egalement appelé œdème du trayon avec érythème.


Source : Institut de l'Elevage

Causes

- Le réglage de la machine.
- Le matériel de traite non adapté (manchons).
- L'entretien du matériel de traite.
- La technique de traite.

Moyens de lutte

À voir avec le conseiller traite (cf. fiches "L'entretien de la machine à traire" et "La traite : un savoir-faire").



Surveiller l'état des trayons

Objectif

Conserver les trayons en bon état pour prévenir les mammites.

Les risques associés à des trayons endommagés sont divers :

- prolifération des agents pathogènes sur la peau, comme le staphylocoque doré,
- pénétration de bactéries à l'intérieur du trayon,
- traite plus stressante, plus longue et plus douloureuse,
- nettoyage et désinfection des trayons moins efficaces,
- contagion accentuée.

Observations

À la traite, repérer la présence de gerçures, de crevasses, de blessures, de verrues ou d'infection sur la peau.

	Lésions	Causes fréquentes	Moyens de lutte
	Congestion, œdème des trayons	vide élevé et/ou pulsation mal réglée.	Voir chapitre précédent "Détecter les anomalies liées à la machine à traire".
	Gerçures, brûlures, crevasses	Phénomènes climatiques (effet du froid sur des trayons humides, coup de soleil, etc.) ou saisonniers (mise à l'herbe...). Agression chimique.	Désinfecter les trayons après la traite avec un produit à action cosmétique. Attention aux interactions entre produits d'hygiène.
	Blessures	Conditions de logement et de pâturage. Accidents (barbelés, coup de corne, etc.). Conformation de la mamelle.	Identification et suppression des facteurs de risques. Intervention rapide du vétérinaire.
	Infections de la peau, verrues	Virus (ex. : pseudovariole). Bactérie : (ex. : staphylocoque).	Pas de traitements spécifiques contre les virus. Agir sur les vecteurs de la contagion*. Adapter les produits sur les trayons avec l'appui de votre vétérinaire.

* (cf. fiches "Hygiène avant la traite", "Hygiène après la traite" et "Hygiène du lieu de traite et du trayeur").




A NOTER

Une guérison rapide des lésions limite le risque d'infection mammaire.

Détecter précocement les mammites cliniques

Objectif

Une détection précoce permet d'augmenter les chances de la guérison.



Source : Xavier Berthelot – Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Observations


Les mammites cliniques peuvent être dépistées avant chaque traite par examen des premiers jets traits, idéalement dans un bol à fond noir. La modification de la consistance du lait (grumeaux, etc.) constitue le symptôme le plus fréquent et le plus probant.

D'autres signes peuvent être associés : rougeur, douleur, chaleur de la mamelle, baisse de production, variation de la conductivité, modifications de comportement de la vache (réticence à la traite, piétinement anormal), etc.

Mais rester vigilants quant à leur interprétation.

Causes - Moyens de lutte - Prévention

Voir la fiche "Les mammites et les cellules".



GIE Élevage des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard
BP 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
Tél. 02 41 18 61 15 - Fax 02 41 18 60 21
Courriel : bovinslait@pl.chambagri.fr

